



INSTITUTO DE
PATOLOGÍA

VIÑA DEL MAR

INFORME DE BIOPSIA



NOMBRE : RODRIGO ANTONIO DIAZ LINEROS
RUT : 14.438.770-8
EDAD : 46 Años, 07 Meses
MÉDICO SOLICITANTE : DR(A). ALEX DIAZ M.
CENTRO SOLICITANTE : CLINICA CIUDAD DEL MAR

N° INFORME : B20-3495
FECHA SOLICITUD : 10-09-2020
FECHA INFORME : 23-09-2020

ÓRGANO(S): COLON

ANTECEDENTES CLÍNICOS: Evaluación rectorragia. Colonoscopia: Múltiples divertículos del sigmoides, sin signos de complicación. en sigmoides proximal se observa pólipos pediculado de base ancha y polo cefálico de unos 25 x 20 mm, presenta patrón VS desestructurado y superficie erosionada. Poliplectomía con asa diatérmica previa elevación de base y pedículo con adrenalina diluida. Se verifica distancia polo cefálico-pedículo app 7 mm. Revisión de hemostasia más instalación de endoclips (2) de seguridad. Recuperación para biopsia con asa malla. Otros 3 pólipos sésiles de 3 a 4 mm en sigmoides, extirpados con pinza para biopsias. Todas las muestras al mismo frasco (frasco 1). Mucosa de recto de características normales, retrovisión rectal hemorroides internas pequeñas no complicadas. Canal anal hemorroides externas pequeñas.

MUESTRA(S): MUCOSA COLONICA

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: COLONOSCOPIA HASTA CIEGO. POLIPO GRANDE PEDICULADO DEL SIGMOIDES PROXIMAL. (0-1p DE PARIS / NICE 3 CON SUPERFICIE EROSIONADA). POLIPECTOMIA CON ASA DIATERMICA MAS INSTALACION DE ENDOCLIPS (2) DE SEGURIDAD AL LECHO. BIOPSIA. POLIPOS (3) SESILES DIMINUTOS DEL SIGMOIDES (0-1s DE PARIS / NICE 2), EXTIRPADOS CON PINZA PARA BIOPSIAS. DIVERTICULOSIS MULTIPLE DEL SIGMOIDES, SIN SIGNOS DE COMPLICACION. HEMORROIDES MIXTAS (INTERNAS G1 / EXTERNAS G1).

EXAMEN MACROSCÓPICO:

En formalina, 4 muestras endoscópicas de 2 y 3 mm (A).

Además, estructura poliposa pediculada de 1,6 x 1 x 0,6 cm a nivel de la cabeza y tallo de 0,7 x 0,6 cm. Superficie lobulada, pardo-violácea, microgranular (B).

TÉCNICAS EMPLEADAS: TINCIÓN CORRIENTE HE Y PAS

DIAGNÓSTICO:

-POLIPO HIPERPLASTICO DEL INTESTINO GRUESO (4 FRAGMENTOS MENORES; A).

-ADENOMA TUBULAR DEL INTESTINO GRUESO CON ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO, INFILTRANTE EN LA SUBMUCOSA (NIVEL 1 DE HAGGITT; FRAGMENTO MAYOR; B)

NOTA:

El adenocarcinoma mide 1,5 cm de diámetro mayor y se encuentra a 8 mm del borde quirúrgico profundo.

No se identificaron permeaciones tumorales vasculares.

CIE-10: K635
C18

Dr(a). Gilda Lezana



Código verificación: I2DT-kjkg-en5u-yqmz

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada.