

ANEXO "A"
USO DE ANTÍDOTOS

TÓXICO	ANTÍDOTO	ADMINISTRACIÓN	OBSERVACIÓN
ÁCIDO CIANHÍDRICO Y CIANUROS	1. NITRITO DE AMILO.	1. Administrar por inhalación rompiendo una ampolla en un apósito y colocándola sobre la nariz del paciente durante 30 segundos. Repetir cada 5 minutos. Suspenda cuando se comience a administrar el Nitrito de Sodio.	1. Respiración asistida con Oxígeno al 100 %. 2. En caso de ingestión de Cianuros, efecto gástrico, previa intubación endotraqueal. 3. Control riguroso de presión arterial ya que son potentes hipotensores. 4. Exámenes de laboratorio. (Determinación de la Metahemoglobina).
	2. NITRITO DE SODIO.	2. Al mismo tiempo administrar Nitrito de Sodio al 3% en solución endovenosa a la velocidad de 2,5 a 5 ml por minuto. La dosis total puede variar entre 0,20 a 0,40 ml por Kg de peso del paciente de acuerdo a la respuesta clínica o hasta que la metahemoglobinemia que produce el nitrito alcance un 40% de hemoglobina. DOSIFICACION: 40 kg = 8 – 16 ml 70 kg = 14 – 28 ml 50 kg = 10 – 20 ml 80 kg = 16 – 32 ml 60 kg = 12 – 24 ml	
	3. TIOSULFATO DE SODIO.	3. Administrar solución de Tiosulfato de Sodio al 25% Endovenoso después de la administración de la dosis inicial de Nitrito de Sodio, a la velocidad de 2,5 a 5 ml por minuto. La dosis total varía entre 0,95 a 1,95 ml de solución de Tiosulfato de sodio al 25% por Kg de peso del paciente. DOSIFICACIÓN: 40 kg = 38 – 78 ml 70 kg = 66,5 – 136,5 ml 50 kg = 47,5 – 97,5 ml 80 kg = 76 – 156 ml 60 kg = 57 – 117 ml	